



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (1° Livello)

SEZIONE 1

[L'atmosfera](#)

[Il ciclo dell'acqua](#)

[la pressione](#)

[la temperatura](#)

[Gli strumenti](#)

[meteorologici](#)

La pressione atmosferica



Un po' di storia : Evangelista Torricelli

Torricelli, fisico e matematico italiano, realizzò nel 1644 il primo barometro a mercurio, arrivando con metodo sperimentale alla definizione dell'unità di pressione atmosferica. Prendendo un'asta cava graduata di nota lunghezza contenente mercurio per tutta la sua lunghezza, e capovolgendola in una bacinella vuota, egli notò che, in condizioni sperimentali e all'equilibrio, il mercurio, non defluiva completamente nella bacinella vuota ma raggiungeva una determinata altezza all'interno dell'asta graduata, ed in corrispondenza di tale scala si poteva leggere il valore della pressione atmosferica. Da questa esperienza successivamente fu possibile ricavare il valore della pressione atmosferica in condizioni normali o standard e definire anche i concetti di "alta pressione" e di "bassa pressione"

La pressione atmosferica può variare.

Poiché l'atmosfera è un fluido in continuo movimento solo perché partecipa per trascinamento al moto di rotazione terrestre, in tutti i suoi punti, anche la pressione atmosferica è soggetta a delle variazioni. Ogni variazione della pressione atmosferica, è l'effetto misurabile di una variazione della massa totale dell'aria contenuta nella colonna atmosferica di sezione unitaria, sovrastante quel punto; ovvero la pressione è concepita come forza applicata su una superficie.

Possiamo così riassumere le variazioni della pressione :

VARIAZIONI INDIVIDUALI	VARIAZIONI LOCALI O DI CAMPO
<p style="text-align: center;">STAGIONALI:</p> <p>sono legate alle stagioni; il riscaldamento ed il raffreddamento differenziati di alcune zone della terra in ragione dei periodi dell'anno producono delle strutture bariche permanenti o semipermanenti che caratterizzano lo stato del tempo in determinate regioni della Terra</p> <p>(Es: Anticiclone delle Azzorre, Depressione sull'Islanda, Alta polare artica ed antartica, Anticiclone e depressione monsonica asiatica)</p>	<p>sono quelle variazioni prodotte dai moti atmosferici a tutte le scale e sono essenzialmente responsabili del cambiamento repentino delle condizioni del tempo in una determinata zona del nostro pianeta.</p> <p>Possono essere variazioni orizzontali o verticali cioè legate al gradiente orizzontale o topografico della pressione oppure ai moti verticali della massa d'aria</p>
<p style="text-align: center;">GIORNALIERE:</p> <p>la pressione ha un andamento altalenante con due massimi e due minimi giornalieri corrispondenti rispettivamente ai minimi ed a i massimi valori di temperatura</p>	<p style="text-align: center;">AVVETTIVE</p> <p>sono operate dal moto orizzontale di uno o più strati della colonna d'aria preesistente (in deflusso) con aria (in afflusso) più calda o più fredda</p>

<p>GEOGRAFICHE e/o ALTIMETRICHE :</p> <p>sono dovute essenzialmente alla posizione geografica o all'altimetria del luogo</p>	<p>per CONVERGENZA o DIVERGENZA</p> <p>cioè per incremento e/o depauperamento di massa d'aria per effetto di afflusso o deflusso orizzontale differenziato</p>
<p>GRAVIMETRICHE :</p> <p>per il diverso valore della accelerazione di gravità in base alla diversa latitudine</p>	<p>dovute a MOTI VERTICALI</p> <p>sono variazioni che causano in seno ad una sezione della colonna atmosferica un aumento o una diminuzione della densità</p>
<p>TERMOMETRICHE</p> <p>legate cioè alle variazioni di temperatura</p>	

Come si misura la pressione atmosferica.

L'unità di misura della pressione atmosferica è l'hectopascal .Torricelli stabilì l'equivalenza :

1 atm = 760 mmHg = 101325 N/m² = 101325 Pa = 1013,25 hPa

1 Pa = 1N/m² = 10 dine/cm²

a temperatura di 15° , al livello del mare e alla latitudine di 45° 15' 13"N.

L'insieme di tali condizioni di misura si definisce standard e la pressione misurata in tale atmosfera e' il valore normale della pressione in "[ATMOSFERA TIPO O STANDARD](#)". Inoltre ,l'entità della variazione di quota per hectopascal (cioè la variazione di pressione per hPa) sino alla quota di 500-700 mt sul livello del mare è di 1 hpa ogni 8.5 metri o 28 ft di variazione di quota ; poi la variazione di pressione per hectopascal o per pollice di Hg aumenta al crescere dell'altezza sul mare. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale , alle quote standard si ha la seguente relazione pressione-altezza:





hpa	metri	feet/piedi	livello di volo
850	1500	5000	50
700	3000	10000	100
500	5500	18000	180
400	7000	24000	240
300	9000	30000	300

Analoghe relazioni si possono stabilire per altri livelli sia standard che non standard.


Le rappresentazioni bariche

Definito il valore normale della pressione atmosferica in aria tipo o standard possiamo affermare allora che nelle zone del nostro pianeta in cui esiste una pressione di valore superiore a quello normale siamo area di ALTA PRESSIONE mentre dove la pressione ha un valore minore, siamo in aree di BASSA PRESSIONE. Immaginiamo pertanto di poter conoscere ad un dato istante i valori di pressione di tutte le città' europee o in determinati punti della superficie terrestre , corrispondenti a stazioni di osservazione e di riportare tali valori su una carta geografica adeguata .Pensiamo inoltre di poter unire tutti i punti che hanno lo stesso valore di pressione con un tratto continuo non con una spezzata ma con un tratto curvilineo . Le isolinee così costruite sono dette ISOBARE o linee che uniscono punti di uguale pressione al suolo. Se conoscessimo ad un dato istante l'altezza della superficie isobarica di 500 hPa sui medesimi punti , unendoli con una linea di tratto continuo otterremmo delle ISOIPSE o linee


che uniscono punti della stessa superficie isobarica o di ugual pressione, che rispetto a tale superficie si trovano alla stessa altezza. Guardando una mappa meteorologica di quelle disseminate dal Servizio Meteorologico, costruita sovrapponendo ad un noto grigliato geografico in una determinata proiezione (solitamente stereografica polare tagliata al 60° Nord) i campi di pressione al suolo o in quota, confrontando i valori presenti con il valore normale, possiamo identificare con chiarezza le aree di alta pressione e quelle di bassa pressione. Le zone di alta pressione e quelle di bassa pressione sono i veri centri di azione del tempo meteorologico e la loro formazione ed evoluzione nel tempo determina proprio l'alternanza di tempo bello e soleggiato con tempo perturbato su una determinata zona del nostro pianeta. In meteorologia, si usano le seguenti definizioni:

<p>ALTA PRESSIONE : ANTICICLONE o MASSIMO di PRESSIONE ; e' un'area chiusa di pressioni dal valore crescente dalla periferia verso il centro con il massimo al centro.</p>	
<p>BASSA PRESSIONE : DEPRESSIONE o MINIMO DEPRESSIONARIO ; e' un'area chiusa di pressioni dal valore decrescente dalla periferia verso il centro con il valore più basso al centro</p>	
<p>PROMONTORIO : lingua di alta pressione che si protende da un anticiclone con valori di pressione decrescenti</p>	
<p>SACCATURA : lingua di bassa pressione che si protende da una depressione con valori di pressione crescenti</p>	


SELLA BARICA : zona compresa tra due minimi depressionari e due anticicloni opposti; in essa la pressione e' costante o quasi costante .



PENDIO : area compresa tra una depressione o saccatura e un anticiclone o promontorio contigui o comunque tra due zone dove esiste una differenza orizzontale di pressione.



AREA DI PRESSIONI LIVELLATE : zona in cui la pressione per grandi estensioni di spazio non presenta sostanziali variazioni.



[back](#) [home](#) next



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (1° Livello)

SEZIONE 1

[L'atmosfera](#)

[Il ciclo dell'acqua](#)

[la pressione](#)

[la temperatura](#)

[Gli strumenti meteorologici](#)

L'atmosfera terrestre e le sue caratteristiche fisiche



Origine ed evoluzione

Il nostro pianeta è avvolto da una massa gassosa dalla complessa composizione formatasi milioni di anni fa in seguito a processi fotochimici e termodinamici associati ai grandi sconvolgimenti geologici che hanno determinato l'attuale assetto del pianeta. Questa massa gassosa segue la forma della terra, presenta uno schiacciamento ai poli e un rigonfiamento nelle zone equatoriali e tropicali; inoltre è attratta verso la superficie terrestre dal proprio peso ed è trascinata nel suo insieme dal moto di rotazione della terra intorno al proprio asse. Proprio l'efficienza della forza di gravità terrestre impedisce all'atmosfera di sfuggire dal pianeta e di renderlo un deserto freddo. L'aria che respiriamo è in realtà un miscuglio di gas di diversa composizione: i principali sono l'AZOTO (simbolo chimico N) per circa 78% l'Ossigeno (simbolo chimico O₂) per circa il 20%, Anidride Carbonica (CO₂) per lo 0,1%; a questi si aggiungono, in percentuali molto piccole i gas alogeni e rari.

Gli strati dell'atmosfera

L'atmosfera in base alla sua composizione e alla concentrazione dei principali elementi che la caratterizzano, può essere suddivisa in OMOSFERA (fino a 80 km di quota) e ETROSFERA (80-600 km di quota). Il primo strato dell'OMOSFERA è la TROPOSFERA; la troposfera è sede dei principali fenomeni meteorologici; in essa si concentra i 3/4 di tutto il vapore acqueo ed ha uno spessore variabile con la latitudine (più bassa ai poli e più alta all'equatore); nella troposfera la temperatura decresce più o meno regolarmente dal suolo verso l'alto da circa +20 °C a -55 °C. Lo strato successivo detto TROPOPAUSA è un sottile strato dello spessore di 100-300 metri ed è caratterizzata da una isoterma e dalla presenza di forti correnti orizzontali di grande intensità dette CORRENTI A GETTO. Lo strato superiore detto STRATOSFERA invece si estende fino a 40 km di quota e in esso la temperatura cresce con la quota pur restando complessivamente quasi costante; nubi caratteristiche (nubi madreperlacee) sono presenti in questo strato che presenta anch'esso delle correnti orizzontali molto forti che hanno però una inversione della direzione di tipo stagionale. Lo strato sovrastante detto MESOSFERA, separato dalla STRATOSFERA dalla STRATOPAUSA, giunge fino a 80 km di quota; è caratterizzato da un andamento prima altalenante della temperatura (prima cresce poi decresce con la quota), poi crescente fino a circa 300 °C, e dalla presenza delle nubi nottlucenti. La MESOPAUSA è lo strato di transizione tra la mesosfera

e la TERMOSFERA ; raggiunge temperature di circa $-70^{\circ}\text{C}/-100^{\circ}\text{C}$. La TERMOSFERA invece si estende fino a 400 km di quota , in essa la temperatura cresce con la quota. La TERMOSFERA presenta strati di gas ionizzati (IONOSFERA) che consentono la propagazione delle onde radio ma , soprattutto e' sede di importanti fenomeni elettrici e geomagnetici come le aurore polari . L'ultimo strato, l'ESOSFERA e' separato dalla TERMOSFERA dalla TERMOPAUSA ; nella ESOSFERA la temperatura e' costante con la quota.




Fig.1 Profilo termico dell'atmosfera

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (1° Livello)

SEZIONE 1

[L'atmosfera](#)

[Il ciclo dell'acqua](#)


[la pressione](#)

[la temperatura](#)

[Gli strumenti](#)

[meteorologici](#)

Il ciclo dell'acqua




L'acqua è il liquido più diffuso e la sostanza più importante sulla Terra: la usiamo per bere, per lavarci, in essa nuotiamo e ci lamentiamo quando piove...

L'acqua influisce sulla nostra vita in molti modi: anzitutto determina dove possiamo vivere, il tempo che farà, se possiamo quindi far crescere il raccolto e produrre abbastanza cibo. Grandi quantità d'acqua vengono usate anche nell'industria, per esempio nei processi di raffreddamento delle grandi centrali elettriche o come solvente. Vi sono immense quantità di acqua raccolte negli oceani e nei mari; solo una piccola percentuale si trova sui continenti, ma anch'essa proviene in ultima analisi dall'oceano, cui è destinata a tornare portata dai fiumi.

L'irraggiamento solare provoca l'evaporazione dell'acqua nell'aria da fiumi, laghi ed oceani. Questo vapore acqueo, innalzandosi, si raffredda e condensa formando goccioline d'acqua raccolte in nuvole.

Quando le gocce sono abbastanza grosse, cadono sulla terra sotto forma di pioggia. In parte quest'acqua evapora e ritorna nell'aria, in parte viene utilizzata dalle piante; ma la quantità più cospicua filtra attraverso il terreno, o si riversa nei fiumi sfociando infine nel mare. L'intero ciclo ricomincia quindi da capo.

Questo movimento continuo di acqua dalla superficie della terra alle nuvole e quindi di nuovo alla terra sotto forma di pioggia è chiamato ciclo dell'acqua (hydrologic cycle). A livello planetario il ciclo dell'acqua è strettamente connesso ai grandi flussi di energia nell'atmosfera. Il volume totale di acqua nell'atmosfera è stato stimato in circa $1.3 \times 10^{13} \text{ m}^3$ (13 mila km^3), la gran parte nella fase di vapore; di contro gli oceani contengono circa $1.35 \times 10^{18} \text{ m}^3$ di acqua (1350 milioni di km^3).



Il rapporto tra i volumi di acqua nell'atmosfera e negli oceani è 1/100000, all'incirca lo stesso del rapporto tra l'acqua contenuta in un ditale e quella in una vasca da bagno. Ciononostante il vapor d'acqua atmosferico è uno dei più importanti fattori nel determinare il tempo ed il clima, soprattutto per la grande quantità di energia messa in gioco quando l'acqua cambia il suo stato di aggregazione tra la fase gassosa (vapore), liquida e solida, e per il suo contributo come gas responsabile dell'effetto serra.

Il riscaldamento differenziato della superficie della Terra da parte del Sole crea le condizioni che sono alla base dei grandi trasferimenti di masse d'aria tra equatore e poli: mentre le regioni equatoriali ricevono più calore di quanto non ne perdano, le zone più vicine ai poli perdono più calore di quanto non ne ricevano. Due fondamentali correnti di convezione di alta quota (simmetriche, dall'equatore verso i due poli) distribuiscono in maniera più equilibrata il calore. (I trasferimenti d'aria determinati dalle differenze di pressione sono i venti).

Un ruolo importante in questo trasporto di calore e quindi di energia è legato all'acqua, che evapora nelle zone equatoriali, viene trasportata a seguito delle masse d'aria verso i poli sotto forma di vapore, condensa nelle nubi, precipita sotto forma di pioggia o neve che la riportano di nuovo sulla superficie terrestre e quindi nei mari.

Il concetto di umidità controlla il tasso di evaporazione, la formazione delle nubi, il tempo ed il luogo delle precipitazioni. L'umidità indica la quantità di vapor acqueo nell'atmosfera: i principali contributi sono l'evaporazione dalla superficie della terra e la traspirazione delle piante. Le precipitazioni sono a loro volta il fenomeno che diminuisce la presenza di acqua nell'atmosfera.

I meteorologi hanno definito diversi modi per indicare l'umidità, che possono essere divisi in due categorie: quelli che esprimono la quantità effettiva, o concentrazione, di vapor acqueo nell'aria e quelli che mettono in relazione la quantità effettiva presente con la quantità potenziale che l'aria potrebbe contenere se fosse saturata di vapore. L'aria si dice saturata quando contiene la massima quantità possibile.

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (1° Livello)

SEZIONE 1

[L'atmosfera](#)

[Il ciclo dell'acqua](#)

[la pressione](#)

[la temperatura](#)

[Gli strumenti](#)

[meteorologici](#)

La temperatura dell'aria

L'atmosfera non ha in tutti i suoi punti, ad un determinato istante, una temperatura nota e costante nel tempo, perché soggetta a riscaldamento differenziato da parte del sole dall'alto e a riscaldamento o raffreddamento dal basso operato dalla superficie terrestre. In generale l'andamento della temperatura di una data stazione o località nel tempo, cioè le cosiddette variazioni di temperatura sono influenzate da diversi fattori ; si definisce ESCURSIONE TERMICA la differenza tra la temperatura massima e la temperatura minima misurate in una data località in un certo intervallo di tempo . Così potremo parlare di andamento o escursione termica annuale , mensile, giornaliera . Tre sono i fattori che influenzano le variazioni di temperatura :

- latitudine : l'escursione termica giornaliera e' decrescente con la latitudine (minima ai poli e massima all'equatore). Alle basse latitudini inoltre il massimo giornaliero è spostato rispetto allo zenith del sole sul piano dell'orizzonte ed il minimo e' poco dopo l'alba. Infatti dall'alba a mezzogiorno la Terra assorbe la radiazione solare e riscalda l'aria soprastante ma la presenza dei corpi condensati (nubi) e del vento e del vapore acqueo fa sì che il massimo di temperatura non sia in corrispondenza della massima insolazione. Dopo il tramonto invece la terra prosegue il suo raffreddamento in attesa di un nuovo apporto di energia fin dopo l'alba ; così la temperatura minima e' in ritardo rispetto all'alba.
- continentalità : l'andamento annuale della temperatura per esempio per le zone continentali e' crescente da gennaio a giugno con un massimo nel mese di luglio , spostato rispetto al solstizio d'estate , mentre nelle zone equatoriali presenta due massimi in corrispondenza degli equinozi . Le zone marine influenzano l'andamento diurno della temperatura. Infatti il mare ha maggior potere riflettente della radiazione solare, maggiore capacità termica , maggiore capacità di condurre il calore grazie ai moti convettivi , alle maree e ai moti turbolenti delle onde. A parità di durata del soleggiamento allora , reagisce meno sensibilmente e con un certo ritardo rispetto alla terra scaldandosi di meno e in maggior tempo e , per lo stesso motivo, raffreddandosi meno e più lentamente del terreno.
- presenza di vento, nubi e di vapore acqueo : il vento opera il rimescolamento dell'aria e causa avvezione calda o fredda, mentre le nubi di giorno riducono il riscaldamento della superficie terrestre e di notte ne irretiscono il raffreddamento. Il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera sotto forma di nubi o precipitazioni , opera un forte assorbimento della radiazione terrestre, rallentando il riscaldamento dell'atmosfera.

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it

Gli strumenti della meteorologia

[anemometri](#) [psicrometri](#) [termometri](#) [barometri](#) [pluviometri](#)

Anemografo elettrico autogeneratore




Fig. 4.7 - Anemografo elettrico autogeneratore: trasmettitore.

Il trasmettitore è costituito da un corpo aerodinamico a profilo di aereo, munito di un'elica tripala e di una banderuola che fa ruotare il complesso secondo la direzione del vento, mentre la rotazione dell'elica genera l'energia elettrica necessaria al funzionamento (figura). Il ricevitore può essere installato sino a 5 km di distanza dal trasmettitore, ed è collegato a questo mediante un cavo a 7 conduttori, che prelevano dal generatore le varie tensioni, le quali dipendono dalla velocità del vento e dall'orientamento del corpo del trasmettitore (figura).

Il ricevitore fornisce la registrazione della direzione, della velocità istantanea e del cosiddetto "vento sfilato", per il calcolo della sua velocità media.

Il modello ad uso aeroportuale dispone anche di uno o più indicatori supplementari (solamente per la direzione e la velocità istantanea) che possono essere collocati in altre sedi (Torre Controllo, Ufficio Meteorologico, ecc.).




Fig. 4.8 - Anemografo elettrico autogeneratore: ricevitore-registratore.

Anemometro a mano

È un piccolo anemometro portatile che viene impiegato in caso di avaria degli altri anemografi. L'indicazione della direzione viene fornita da una banderuola che si innesta ad un braccio girevole intorno ad un asse verticale. L'orientamento verso il nord si effettua con un declinatore magnetico incorporato nell'impugnatura. Un mulinello a tre coppe rileva la velocità istantanea che si legge in corrispondenza di un indice che si sposta sulla scala situata sulla superficie del cilindro che forma il corpo dello strumento o su un normale quadrante circolare. Lo spostamento dell'indice è determinato da correnti di Foucault oppure da un sistema centrifugo del tipo "regolatore di Watt".




Fig. 4.15 - Anemometri a mano.

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale

SEZIONE 1

[L'atmosfera](#)

[Il ciclo dell'acqua](#)

[la pressione](#)

[la temperatura](#)

[Gli strumenti meteorologici](#)



Nubi lenticolari

Il corso di meteorologia multimediale, che da oggi inizierà ad essere pubblicato a cadenza settimanale, si pone come obiettivo principale quello di fornire le conoscenze di base e gli approfondimenti a chi, per passione o per studio ha la necessità di conoscere meglio i segreti della Scienza del tempo. Il corso è suddiviso su tre livelli: un livello di base nel quale verranno descritte le caratteristiche dell'atmosfera terrestre, i parametri meteorologici che la caratterizzano (pressione - temperatura - umidità), gli strumenti e le tecniche di rilevamento dei dati meteorologici.

Nel [secondo livello](#) - intermedio - verrà trattata la circolazione generale dell'atmosfera, le masse d'aria, i sistemi frontali ed i fenomeni connessi.

Infine nel [terzo livello](#) - avanzato - si accennerà alle tecniche di previsione e all'uso ed interpretazione delle mappe meteorologiche.

back [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (2° Livello)

Altimetria



Definizioni e procedure per la
determinazione dei parametri
altimetrici QFE, QFF, QNE,
QNH

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (2° Livello)

Altimetria:

Definizioni e procedure per la determinazione dei parametri altimetrici QFE, QFF, QNE, QNH

Definizioni e procedure per la determinazione dei parametri altimetrici QFE, QFF, QNE, QNH

Le espressioni simboliche QFE, QFF, QNE e QNH con cui sono denominati internazionalmente i quattro parametri altimetrici, discendono dal codice Q (ICAO Abbreviation and Codes Doc. 8400/4).

Definizioni:

- **altezza**: distanza verticale tra un livello, un punto o un oggetto assimilato ad un punto, ed un dato di riferimento;
- **altitudine**: distanza verticale tra un livello, un punto o un oggetto assimilato ad un punto, ed il livello medio del mare;
- **elevazione**: distanza verticale tra un punto o un livello sulla superficie terrestre ed il livello medio del mare (in alternativa ad elevazione può essere impiegato il termine *altitudine topografica*).
- **QFE**: valore di pressione (di norma espresso in hPa) da inserire nella subscala dell'altimetro di bordo di un aeromobile, affinché l'altimetro tarato secondo l'atmosfera tipo ICAO, indichi un'altezza zero nel caso in cui l'aeromobile stazioni all'elevazione dell'aeroporto. In virtù del principio di funzionamento degli altimetri possiamo concludere che il QFE coincide con il valore di pressione atmosferica relativo all'elevazione dell'aeroporto. Per QFE di una stazione meteorologica non aeroportuale si intende in maniera estensiva, il valore della *pressione atmosferica vera* del barometro a mercurio ubicato nella stazione medesima.
- **Pressione atmosferica vera**: è la pressione indicata dal barometro a mercurio di stazione cui sono state apportate le correzioni strumentale, gravimetrica e di temperatura.
- **QFF**: valore di pressione (di norma espresso in hPa) ricavato, secondo un algoritmo matematico, dal valore della *pressione atmosferica vera* rappresentativo del punto posto in verticale alla stazione al livello medio del mare. Il QFF è tuttora utilizzato per riportare il valore della pressione sulle carte meteorologiche al suolo delle stazioni del Servizio Meteorologico dell'A.M. il cui pozzetto barometrico non superi di oltre i 500 metri il livello medio del mare.
- **QNE**: valore, in metri o piedi, letto sull'altimetro di bordo di un aeromobile,

avendo inserito nella subscala dell'altimetro, tarato secondo l'atmosfera tipo ICAO, il valore di 1013.2 hPa e trovandosi l'aeromobile al suolo, all'elevazione dell'aeroporto.

- **QNH**: valore di pressione (di norma espresso in hPa) da inserire nella subscala dell'altimetro di bordo di un aeromobile, affinché l'altimetro tarato secondo l'atmosfera tipo ICAO, indichi l'elevazione dell'aeroporto, qualora l'aeromobile si trovi al suolo su tale punto.

Procedure per la determinazione dei parametri altimetrici

QFE: sia :

- p la pressione atmosferica vera del barometro a mercurio di stazione, espressa in hPa;

- H la differenza, in metri, tra l'elevazione del pozzetto barometrico ed il livello del QFE (elevazione dell'aeroporto);

- t la temperatura virtuale di stazione in gradi C;

vale la seguente relazione:

$$QFE = p + C \quad (1)$$

$$\text{Dove } C = H/29.27 * p / (t + 273.15) \quad (2)$$

Il valore di C , in hPa, è negativo o positivo a secondo se rispettivamente il livello del QFE è al di sopra o al di sotto della elevazione del pozzetto barometrico. In una data stazione meteorologica, un volta installato il barometro, H non varia. In tal caso, non si commette un errore significativo se si adotta un valore correttivo fisso per C , sostituendo, nella relazione (2), a p la pressione media annuale ed a t la temperatura media annuale della stazione stessa.

QFF: il QFF viene determinato secondo le procedure illustrate nell' IT 9 ed. 1953. Essendo il QFF in disuso non ci si sofferma sull'argomento.

QNE: il QNE viene determinato, di prassi, tramite l'altimetro, tarato secondo l'atmosfera tipo ICAO, in dotazione alla stazione meteorologica aeroportuale o alla torre di controllo, regolando la subscala su 1013.2 hPa ed avendo cura che lo strumento sia situato alla stessa elevazione dell'aeroporto.

QNH: il calcolo del QNH, partendo dal QFE, è basato sulla relazione tra l'altitudine e la pressione come definita nel Manual of the ICAO Standard Atmosphere (ICAO Doc. 7488). Dato che questa relazione è di tipo logaritmico il valore del QNH dipende dal valore assunto, di volta in volta, dal QFE per una determinata elevazione dell'aeroporto. In linea di principio, pertanto, non può essere usato un fattore costante di riduzione, fatta eccezione per aeroporti prossimi al livello del mare. Per il calcolo del QNH vale la seguente relazione generale, ricavata dalle International Meteorological Tables (WMO No. 188):

$$QNH = A + B * QFE \quad (3)$$

dove A e B sono due fattori costanti per ciascun aeroporto, desumibili dalla tabella I, una volta conosciuta l'elevazione dell'aeroporto o del pozzetto barometrico.

TABELLA I

ALTITUDINE	A	B
0	0	1
50	1.14	1.00481
100	2.29	1.00966
150	3.43	1.01453
200	4.57	1.01943
250	5.71	1.02437
300	6.86	1.02932
350	8	1.03431
400	9.14	1.03933
450	10.29	1.04438
500	11.43	1.04945
550	12.57	1.05457

600	13.71	1.05971
650	14.86	1.06489
700	16	1.07009
750	17.14	1.07532
800	18.29	1.08058
850	19.43	1.08588
900	20.57	1.09122
950	21.71	1.09658
1000	22.86	1.10198

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (3° Livello)

In questa sezione vengono approfonditi alcuni argomenti Meteorologici quali le tecniche di previsione di alcuni fenomeni meteo, alcuni aspetti di meteorologia sinottica etc..

Tecniche di previsione

 [La nebbia e gli strati](#)

Meteorologia Sinottica

 [La circolazione generale dell'atmosfera](#)

 [Struttura dell'atmosfera e principali masse d'aria](#)

 [Classificazione delle masse d'aria](#)

 [Il fronte polare: struttura termica e campo del vento](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (3° Livello)

Corso operativo sulla previsione della nebbia

e degli strati (di Vittorio Villasmunta)

Nebbia e nubi stratificate rappresentano condizioni ad alto rischio sia per gli aerei che per le attività in mare. Un meteorologo può esser chiamato spesso a prevedere la formazione, il sollevamento o il dissolvimento di questi fenomeni. Al fine di fornire le migliori informazioni disponibili, nel presente corso, basato su quattro lezioni, discuteremo dei vari fattori che influenzano la formazione e il dissolvimento della nebbia e degli strati.

Obiettivi delle lezioni:

- ✚ Nella [prima lezione](#) prenderemo confidenza con gli effetti della stabilità di una massa d'aria in relazione alla formazione della nebbia.
- ✚ Nella [seconda lezione](#) identificheremo gli elementi da considerare nella previsione della nebbia.
- ✚ Nella [terza lezione](#), impareremo a riconoscere le condizioni favorevoli alla formazione dei vari tipi di nebbia.
- ✚ Nella quarta ed ultima lezione, calcoleremo i parametri della nebbia usando il diagramma termodinamico.

back home [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



Prima lezione

Effetti della stabilità di una massa d'aria sulla nebbia

LA NEBBIA
[Capitolo 1](#)
[Capitolo 2](#)
[Capitolo 3](#)
 Capitolo 4

Nebbia e strati sono manifestazioni tipiche di una massa d'aria calda. Poiché una massa d'aria calda è più calda della sottostante superficie, essa è stabile, particolarmente negli strati più bassi.

Mediante l'uso dei sondaggi dell'atmosfera superiore, si possono fare misure di temperatura e umidità relativa, da cui determinare caratteristiche di stabilità.

Procedure di base per la previsione della nebbia

La situazione sinottica, il periodo dell'anno, la climatologia della stazione, la stabilità della massa d'aria, l'entità del raffreddamento atteso, la forza del vento, il divario fra temperatura e punto di rugiada, la traiettoria dell'aria al di sopra di superfici con caratteristiche favorevoli, rappresentano tutte considerazioni fondamentali da prendere in esame quando andremo a prevedere nebbia.

Brevi considerazioni sulla geografia e sulla climatologia

Talune aree sono climatologicamente più favorevoli alla formazione della nebbia durante definiti periodi dell'anno piuttosto che in altri. Sarebbe buona norma fruire di tutte le informazioni disponibili concernenti la climatologia della propria stazione o area operativa al fine di determinare ore e periodi più favorevoli alla formazione della nebbia.

Utile è pure determinare l'esposizione della stazione rispetto a condizioni di drenaggio o sollevamento di aria. Quindi, bisogna chiarire il tipo di nebbia a cui la zona risulta esposta. Ad esempio, stazioni all'interno sono più predisposte alla nebbia da irraggiamento, mentre le stazioni costiere sono maggiormente soggette alla nebbia d'avvezione. E' importante, inoltre, valutare quali siano le traiettorie più favorevoli alla genesi della nebbia stessa.

Nebbia frontale

Le nebbie frontali sono associate alla previsione del movimento dei fronti ed alle connesse aree di precipitazione. Per esempio, nebbie si formano davanti al fronte caldo, nel settore caldo al seguito del fronte caldo (quando il punto di rugiada dell'aria calda è più alta della temperatura dell'aria fredda), o dietro un fronte freddo in lento spostamento quando l'aria giunge a saturazione.

Nebbia di massa d'aria

Il primo passo nella previsione delle nebbie di massa consiste nel determinare la traiettoria della massa d'aria e nel valutare le variazioni che sono attese durante la notte. Se la massa d'aria avesse subito un riscaldamento durante il giorno e se non vi fosse stata nebbia nella precedente mattinata, nessuna nube notevole durante il giorno, nessuna traiettoria su superfici acquee, la nebbia non si formerà nottetempo. Ad ogni modo, in autunno ed in inverno, le notti sono lunghe e i giorni corti, e le condizioni sono generalmente stabili. Quando una situazione di nebbia si è verificata, le stesse condizioni tendono a permanere notte dopo notte, e il riscaldamento diurno è insufficiente a portare effettivamente la temperatura al di sopra della saturazione. Inoltre, bisognerebbe determinare se l'aria abbia percorso ampie superfici d'acqua, e se il tragitto

compiuto sia stato sufficiente ad incrementare l'umidità o ad abbassare la temperatura in misura tale da formare la nebbia. A questo punto, si possono costruire nomogrammi, tavole, ecc. usando la depressione del punto di rugiada rispetto al momento di formazione della nebbia in relazione alle varie stagioni ed ai vari venti; in seguito si possono adattare alla luce di ciascuna particolare situazione sinottica.

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



Seconda lezione

Fattori da considerare nella formazione della nebbia e degli strati

LA NEBBIA

[Capitolo 1](#)

[Capitolo 2](#)

[Capitolo 3](#)


[Capitolo 4](#)

Vento, saturazione della massa d'aria, raffreddamento notturno e percorso compiuto dalla massa d'aria rivestono un importante ruolo nella formazione della nebbia o delle nubi stratiformi.

 Vento

La velocità del vento va tenuta in buon conto nella formazione della nebbia e/o di nubi con basso


ceiling. Quando la temperatura ed il punto di rugiada al suolo sono vicine tra loro e correnti vorticosi sono presenti nei 100 piedi o più lungo il piano verticale, il raffreddamento adiabatico nella parte ascendente del vortice potrebbe fornire quell'ulteriore raffreddamento necessario per portare l'aria alla saturazione. Qualsiasi successivo porterebbe l'aria in una condizione temporanea di soprassaturazione. L'umidità in eccesso allora condenserà, dando luogo a nubi a basso ceiling. Il riscaldamento adiabatico nella parte discendente del vortice in genere provocherà l'evaporazione delle goccioline formanti la nube. Se tutte le goccioline evaporano prima di raggiungere il suolo, la visibilità orizzontale dovrebbe mantenersi buona. Comunque, se molte goccioline raggiungono il suolo prima di evaporare, la visibilità orizzontale sarà limitata da una nebbia moderata. Le nubi che si formano nelle aree vorticosi inizialmente assumono un aspetto irregolare e poi diventano frastagliate. Se le nubi formano uno strato compatto, questo sarà composto da nubi del tipo *stratus*. Quando nel vortice è presente aria condizionalmente instabile, o se le correnti d'attrito vorticosi sono abbastanza forti, si formeranno nubi stratocumuliformi.



✚ Saturazione della massa d'aria


La curva di saturazione mostra la quantità di vapore acqueo in grammi per chilogrammo in rapporto alla temperatura dell'aria.

L'aria lungo la curva è satura ed è al suo punto di rugiada. Ogni ulteriore raffreddamento produrrà acqua come risultato della condensazione; pertanto, si formeranno nebbia o nubi basse (in dipendenza della velocità del vento).



✚ Raffreddamento notturno



Il raffreddamento notturno comincia dopo che la temperatura ha raggiunto il massimo durante il giorno. Il raffreddamento continuerà fino al tramonto, o poco dopo. Tale raffreddamento interesserà soltanto gli strati più bassi dell'atmosfera. Se il raffreddamento notturno riduce la temperatura sino ad un valore prossimo al punto di rugiada, nebbia o nubi basse si svilupperanno. La velocità del vento e le asperità del terreno condizionano la profondità dell'aria raffreddata. La calma di vento favorirà un tipo irregolare di nebbia al suolo o formerà una nebbia continua e poco profonda. Venti da 5 a 10




nodi di solito consentiranno alla nebbia di ispessirsi verticalmente. Venti superiori ai 10 nodi causeranno generalmente la formazione di strati bassi o di stratocumuli. (Vedere le figure per esempi sulla formazione di nebbia e di strati).

L'entità del raffreddamento notturno dipende dalla composizione del suolo, dalla vegetazione, dalla copertura nuvolosa, dal ceiling e da altri fattori. La copertura nuvolosa al di sotto dei 10000 piedi produce un effetto serra sulla temperatura superficiale, poiché assorbe alcune radiazioni terrestri e reirradia una parte di questa energia calorifica verso la superficie terrestre da cui viene assorbita. Ciò causa un minor raffreddamento notturno.

Il raffreddamento dalle 15:30 locali al tramonto varierà da un minimo di 5°F - 10°F (con condizioni di cielo coperto da nubi intorno ai 1000 piedi) a 25°F -30°F con cielo sereno o nubi al di sopra dei 10mila piedi. Altri fattori ed eccezioni devono essere considerate. Se attendiamo il passaggio di un fronte sulla stazione nel corso della notte, o se è previsto l'instaurarsi della brezza di mare, l'entità del raffreddamento atteso andrà modificata alla luce di questi sviluppi.






Una stima del momento di formazione della nebbia, e possibilmente, degli strati, può risultare molto più agevole se vengono elaborate alcune carte dei tempi di saturazione, come quella illustrata nella figura, su cui mettere in relazione la temperatura prevista rispetto al punto di rugiada previsto. Nell'uso di questo diagramma, notare la massima temperatura e considerare le condizioni generali del cielo ricavandole dalla carta di analisi al suolo, dalle previsioni, o dalla sequenza dei bollettini. Tracciando la linea della temperatura e quella del punto di rugiada, si può fare una previsioni sul momento di formazione della nebbia. Se si nota del fumo in zona, la nebbia normalmente tenderà a formarsi un'ora prima rispetto a quanto indicato sul diagramma a causa dell'abbondanza dei nuclei di condensazione.

Percorso della massa d'aria

Il percorso di una massa d'aria durante il periodo di previsione può rappresentare un altro importante fattore di formazione della nebbia. L'aria calda in movimento al di sopra di una superficie più fredda costituisce una delle cause primarie di nebbia. Quanto detto può verificarsi



quando una stazione si trova nel settore caldo, al seguito del passaggio di un fronte caldo. Ha luogo il raffreddamento della massa d'aria, che provoca condensazione e nebbie estese oppure formazione di strati bassi. Per determinare le probabilità di condensazione dietro un fronte caldo, si deve comparare la temperatura davanti al fronte con il punto di rugiada dietro il fronte. Se la temperatura davanti al fronte caldo è più bassa del punto di rugiada della parte posteriore del fronte, la massa d'aria dietro il fronte si raffredderà alla temperatura anteriore al fronte, provocando condensazione e formazione di nebbia oppure basse temperature in vicinanza degli strati.

Sulle superfici acquee, l'aria calda che passa su acqua fredda può causare un raffreddamento sufficiente da consentire la condensazione e lo sviluppo di nubi basse.

Un altro esempio in cui il percorso compiuto risulta importante è quando aria fredda si sposta sopra uno specchio d'acqua calda, terreno acquitrinoso, o paludoso, producendo nebbia vaporosa. Oltre a ciò, l'aria che transita sopra una superficie umida causerà l'evaporazione di parte dell'umidità superficiale, e conseguentemente un incremento del punto di rugiada. Ovunque sia presente una sorgente di umidità, l'aria ne provocherà l'evaporazione di una parte, a meno che la pressione di vapore dell'aria sia grande quanto o più della pressione di vapore dell'acqua. Un innalzamento del punto di rugiada può essere sufficiente da permettere alle ampie correnti vorticose, al raffreddamento notturno, o al sollevamento forzato ad opera del suolo, di completare il processo di saturazione e dare inizio alla condensazione.

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



Terza lezione

LA NEBBIA







[Capitolo 1](#)

[Capitolo 2](#)

[Capitolo 3](#)

[Capitolo 4](#)

Sommario:

-  [Condizioni favorevoli per la nebbia da irraggiamento](#)
-  [Condizioni favorevoli per la nebbia da irraggiamento-avvezione](#)
-  [Condizioni favorevoli alla nebbia ed agli strati da sollevamento lungo un pendio](#)
-  [Condizioni favorevoli alla formazione di nebbia frontale](#)
-  [Condizioni favorevoli alla formazione di nebbia marina](#)
-  [Condizioni favorevoli alla nebbia ghiacciata](#)

Condizioni favorevoli per la nebbia da irraggiamento

Idealmente, affinché possa formarsi nebbia da irraggiamento, la massa d'aria dovrebbe essere stabile, umida negli strati più bassi, secca al di sopra, e sotto una copertura nuvolosa durante il giorno, con cielo sereno di notte. I venti dovrebbero essere leggeri, le notti lunghe, e la sottostante superficie umida.

Un'area di alta pressione, stazionaria, subsidente, fornisce le migliori premesse per venti leggeri, cieli sereni, stabilità, ed aria secca alle quote superiori. Se l'aria fosse passata su una superficie acquee, o se avesse giaciuto su un suolo in precedenza umidificato da un fronte di precipitazioni attivo, la superficie umida causerebbe un incremento del punto di rugiada negli strati più bassi dell'aria. Inoltre, lunghe notti contrapposte a corti giorni, in autunno ed in inverno, costituiscono condizioni favorevoli alla formazione della nebbia da irraggiamento.

Condizioni favorevoli alla nebbia d'irraggiamento-avvezione

Freddo e umido sono elementi descrittivi adatti per masse d'aria che si formano in tarda estate o nel primo autunno nei quadranti occidentali delle Bermuda High. Freddo e umido sono anche le ciclogenese che lasciano la costa orientale degli Stati Uniti, così come il flusso meridionale associato alle alte polari continentali che si sono spostate verso l'oceano.

Se questa massa d'aria si muove verso l'entroterra (sostituendo aria continentale calda e secca), potrebbe raffreddarsi sino alla saturazione per irraggiamento, nel corso delle lunghe notti autunnali, con conseguente formazione di nebbia o strati. La nebbia è circoscritta alle aree costiere, estendendosi nell'entroterra per 150-250 miglia, in relazione alla velocità del vento. Sulla costa orientale, essa è limitata alle regioni tra gli Appalachi e l'Oceano Atlantico.

In tardo autunno ed in inverno, quando i gradienti continentali di temperatura vanno intensificandosi, e la temperatura del suolo è divenuta più fredda dell'acqua adiacente, aria di origine polare in movimento si raffredda per avvezione sopra il suolo più freddo, ma anche per

irraggiamento. Se l'aria possiede una sufficiente umidità, nebbia e strati possono formarsi. Durante le ore d'insolazione, il riscaldamento può dissipare interamente sia la nebbia che gli strati. Se questo non accade, il riscaldamento, insieme al vento che sta avvertendo l'aria, innalza un'inversione per turbolenza e allora nubi stratiformi o stratocumuliformi si formano alla base dell'inversione. Di notte, se l'aria subisce un nuovo raffreddamento ed il gradiente di pressione al suolo è debole, un'inversione al suolo può sostituire l'inversione per turbolenza, e perciò la nebbia può nuovamente formarsi in prossimità del suolo. Ad ogni modo, se il gradiente barico è forte, il raffreddamento irrobustirà l'inversione. Sotto tali condizioni, le nubi stratiformi o stratocumuliformi si presenteranno proprio durante le ore diurne, ma non con basi basse.

Nel tardo autunno ed in inverno, le nebbie d'avvezione-irraggiamento si verificano in tutti quei posti del continente raggiungibili da aria marittima o da aria continentale di ritorno modificata. Questo accade principalmente sulla metà orientale degli Stati Uniti. Comunque, poiché le masse d'aria tropicali non si spingono fino alle alte latitudini, in inverno come in estate, la frequenza di tali nebbie sono molto minori nelle regioni settentrionali del Paese. Tuttavia, in presenza di alte continentali calde, ampie e in lento movimento, sulla parte orientale del Paese, le nebbie possono estendersi ovunque dal golfo del Messico al Canada.



Condizioni favorevoli alla nebbia ed agli strati da sollevamento lungo un pendio

La nebbia e gli strati da sollevamento lungo un pendio si verificano in quelle regioni in cui le terre sono caratterizzate da un dolce declivio, e in quelle aree accessibili alle masse d'aria stabili ed umide. In Nord America, le aree in cui maggiormente si riscontrano queste condizioni sono le Grandi Pianure degli Stati Uniti e del Canada e le regioni pedemontane orientali degli Appalachi.

Le condizioni sinottiche necessarie per la formazione di questo tipo di nebbia o strati sono costituite da presenza di aria umida e di vento con una componente inclinata verso l'alto. Gli strati non vengono trasportati sulla stazione come una compatta cortina. Essi si formano progressivamente in alto. La differenza di tempo che intercorre fra la prima comparsa di strati e la costituzione del ceiling solitamente va da mezz'ora a due ore; tuttavia talvolta, gli strati possono non formare un ceiling *at all*. Una procedura molto utile consiste nel controllare ogni ora le osservazioni effettuate dalle stazioni circostanti, specialmente di quelle poste a sud-est. Se qualcuna di queste stazioni inizia a riportare strati, le possibilità che si formino strati sulla vostra stazione sono alte.

Condizioni favorevoli alla formazione di nebbia frontale

Le nebbie frontali sono di tre tipi: prefrontali (da fronte caldo), postfrontali (da fronte freddo) e da passaggio frontale.

Nebbia prefrontale

Le nebbie prefrontali (da fronte caldo) si verificano nelle masse d'aria stabili di origine polare continentale (cP) quando aria calda piovosa scorre sopra aria fredda. La pioggia innalza il punto di rugiada della massa d'aria cP di quella quantità sufficiente per produrre nebbia. In genere, l'intensità del vento è debole, e l'area più favorevole alla formazione di questo tipo di nebbia è quella posta tra le vicinanze di un minimo secondario e il centro principale della depressione. Probabilmente l'area nordoccidentale degli Stati Uniti è la regione dove prevale questo tipo di nebbia. La nebbia prefrontale costituisce un elemento importante lungo il Golfo e le pianure costiere dell'Atlantico, il Midwest, e nelle vallate dei monti Appalachi. Una regola empirica per la previsione del ceiling nel corso di nebbie prefrontali è questa: se i venti di gradiente sono superiori ai 25 nodi, il ceiling solitamente sarà intorno ai 300 piedi o di più durante le ore notturne.

Nebbia postfrontale

Come per la nebbia prefrontale, anche quella postfrontale (da fronte freddo) è causata dalle precipitazioni. Nebbie di questo tipo sono comuni quando fronti orientati da est ad ovest sono divenuti quasi stazionari e l'aria polare continentale dietro il fronte è stabile. Nebbie del genere sono frequenti nel Midwest. Nebbia, o nubi stratiformi, possono prevalere per distanze considerevoli dietro il fronte freddo se detto fronte produce precipitazioni.

Nebbia da passaggio frontale

Durante il passaggio di un fronte, la nebbia può formarsi temporaneamente se i venti che si accompagnano al fronte sono molto deboli e le due masse d'aria sono prossime alla saturazione. Inoltre, nebbia temporanea può formarsi se l'aria è improvvisamente raffreddata su suolo umido per il passaggio di un fronte freddo piovoso. Alle basse latitudini, la nebbia può formarsi in estate se la superficie è sufficientemente raffreddata per evaporazione della pioggia che è caduta durante il passaggio del fronte, purché l'aumento di umidità nell'aria e il raffreddamento siano tali da permettere la formazione di nebbia.

Condizioni favorevoli alla formazione della nebbia marina

Le nebbie marine sono nebbie d'avvezione che si formano nelle masse d'aria calde ed umide raffreddatesi fino a saturazione durante il transito sopra superfici acquee più fredde. L'acqua più fredda può risultare come corrente ben definita, oppure come graduale raffreddamento lungo la latitudine. Il punto di rugiada e la temperatura subiscono una graduale variazione quando la massa d'aria si muove al di sopra di acqua più fredda. La temperatura dell'aria presso la superficie scende decisamente, e tende a raggiungere la temperatura dell'acqua. Anche il punto di rugiada tende a raggiungere la temperatura dell'acqua, ma con un andamento più lento. Se il punto di rugiada della massa d'aria è inizialmente **più alto** della acqua più fredda che viene attraversata, e se il processo di raffreddamento va avanti per un tempo sufficiente, la temperatura dell'aria alla fine si porterà fino al punto di rugiada, e ne risulterà nebbia. Comunque, se il punto di rugiada iniziale **è minore** della temperatura dell'acqua più fredda, la formazione della nebbia diventa improbabile. In una massa d'aria moventesi verso settentrione o in una massa d'aria che ha precedentemente attraversato una corrente oceanica calda, il punto di rugiada dell'aria è inizialmente più alta rispetto all'acqua fredda posta a nord, e la nebbia si potrà formare, a patto che si verifichi un *fetch* sufficiente.

La rapidità della diminuzione della temperatura è in larga parte dipendente dalla velocità con cui la massa d'aria si muove attraverso la superficie marina, che, in breve, è dipendente sia dalla distanza delle isoterme sia dalla velocità dell'aria normalmente ad esse.

Il dissolvimento della nebbia marina richiede un cambiamento nella massa d'aria (un fronte freddo). Un movimento della nebbia marina verso un'area con terreno più caldo conduce ad una rapida dissipazione. Sotto riscaldamento, la nebbia dapprima si solleva, formando una coperta di strati; poi, con ulteriore riscaldamento, questa copertura nuvolosa si disperde in stratocumuli, e infine in nubi di tipo convettivo oppure evapora totalmente. Un incremento della velocità del vento può sollevare la nebbia marina, formando una copertura di strati, specialmente se la differenza tra temperatura dell'aria e del mare è piccola. Su acque molto fredde, le nebbie marine dense possono persistere anche in presenza di venti forti.

Condizioni favorevoli alla nebbia ghiacciata

Quando la temperatura dell'aria è all'incirca sotto i -25°F , il vapore acqueo presente nell'aria non appena condensa, si trasforma rapidamente da gocciolina in cristalli di ghiaccio. La sospensione di cristalli di ghiaccio presso il suolo assume la denominazione di "nebbia ghiacciata".

La nebbia ghiacciata appare maggiormente sulle regioni artiche, ed è soprattutto di natura "artificiale", in quanto conseguente all'attività umana. Infatti, si forma localmente in prossimità degli insediamenti e dei campi di volo dove vengono combustibili carburanti a base di idrocarburi. Quando la temperatura dell'aria è prossima ai -30°F o meno, spesso la nebbia ghiacciata si forma rapidamente nei gas esausti degli aeroplani, delle automobili o di altri tipi di motori a combustione. Quando il vento è assente o debole, un aeroplano può generare, nel corso dell'atterraggio o del decollo, nebbia ghiacciata sufficiente a ricoprire la pista ed una parte del campo di volo. In relazione alle condizioni atmosferiche, le nebbie ghiacciate possono persistere per periodi che vanno da pochi minuti a molti giorni.

Esiste anche una nebbia velata artica sottilissima formata di cristalli di ghiaccio e che persiste come foschia sulle ampie distese dei bacini artici nel periodo invernale; questa foschia impalpabile può estendersi verso l'alto per buona parte della troposfera, similmente a nubi cirriformi con la base raggiungente il suolo.

[back](#) [home](#) [next](#)

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (3° Livello)

La circolazione generale dell'Atmosfera

1. Il sole motore principale dell'atmosfera a scala globale

L'origine della circolazione atmosferica viene fatta risalire alla non uniforme distribuzione dell'energia solare in seno al sistema terra-atmosfera. Tale sistema riceve le radiazioni solari, riflettendone e diffondendone una parte e assorbendone l'altra. Alla sommità dell'atmosfera giungono in media $2 \text{ cal/cm}^2 \text{ min}$ delle quali circa il 60% viene assorbito e il rimanente 40 % riflesso e diffuso verso l'alto. L'energia assorbita non si distribuisce in modo uniforme in seno al sistema terra-atmosfera essenzialmente per due motivi, la forma geometrica della terra e l'inclinazione del suo asse di rotazione rispetto alla perpendicolare al piano dell'orbita intorno al sole. La forma geometrica della terra implica che l'angolo di incidenza della radiazione solare, ovvero l'angolo tra raggi del sole e la perpendicolare alla terra nel punto di incidenza, vari con la latitudine e precisamente decresca dai poli verso l'equatore. A causa di ciò la stessa quantità di energia si distribuisce su aree sempre più grandi, man mano che ci si sposta dall'equatore verso i poli, con il risultato che il riscaldamento risulta più intenso alle basse latitudini anziché alle alte. L'inclinazione dell'asse di rotazione della terra rispetto alla perpendicolare al piano dell'eclittica, che è di circa $23,5^\circ$, fa sì che in uno stesso punto del pianeta l'altezza del sole sull'orizzonte vari nel corso dell'anno. Dunque il sole, nel suo moto apparente annuale, compie un'oscillazione completa intorno all'equatore fra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno, per cui sulle località della fascia intertropicale i suoi raggi sono quasi sempre perpendicolari alla superficie terrestre, mentre alle latitudini superiori la loro inclinazione diviene sempre più marcata. Ne consegue che il sistema terra atmosfera riceve molta più energia alle latitudini inferiori che a quelle superiori.

Il sistema a sua volta, come si è visto, riemette energia per irraggiamento e la differenza fra quella ricevuta e quella riemessa costituisce il bilancio radiativo globale. Si è dimostrato che tale bilancio è largamente positivo, ovvero si ha guadagno di calore, alle basse latitudini e notevolmente negativo, ovvero si ha perdita di calore, alle alte latitudini. Nella figura 1 è riportata la distribuzione dell'energia solare ricevuta dalla terra secondo Hufty.





Fig.1 Distribuzione dell'energia solare ricevuta dalla superficie terrestre, nell'emisfero boreale, secondo Hufty.

L'aria, dunque, si dovrebbe scaldare sempre di più alle latitudini intertropicali e raffreddare sempre di più a quelle polari. Ciò in effetti non accade proprio perchè la circolazione generale dell'atmosfera interviene in modo da assicurare un trasporto di calore lungo i meridiani dall'equatore verso i poli, rimuovendo le eccedenze di energia dalle zone intertropicali e compensando le perdite di energia in quelle polari.

2. Le leggi fisiche che intervengono nella circolazione generale dell'atmosfera

L'esperienza mostra che l'aria, a scala globale, presenta movimenti caratteristici di cui conviene tener conto. Alle latitudini extratropicali le correnti atmosferiche fluiscono mediamente da ovest verso est con una velocità maggiore di quella alla quale la terra ruota intorno al proprio asse e sono concentrate a due latitudini particolari: intorno al 60° e al 30° parallelo, rispettivamente alle quote di 8-10 e di 12-14 km. Alle latitudini intertropicali, invece, la circolazione, come risulta evidente osservando i venti nei bassi strati, è mediamente orientale, ovvero si svolge in senso contrario alla rotazione della terra, nonostante l'attrito esercitato dalla superficie di questa.

Da quanto sopra risulta che l'aria acquista momento della quantità di moto rispetto alla terra nelle zone temperate e ne perde in quelle equatoriali. Devono di conseguenza esistere meccanismi atti ad assicurare il trasporto di momento della quantità di moto dalle basse latitudini verso quelle intermedie. Alle latitudini equatoriali, per il forte riscaldamento, vi sono continui movimenti ascendenti dovuti all'azione della convezione. Ciò causa un ulteriore aumento di calore nelle zone intertropicali per via delle grandi quantità di calore che si liberano nella condensazione del vapor d'acqua. Nelle regioni polari, al contrario, a causa del forte raffreddamento, l'aria tende ad avere moti discendenti. Se la terra fosse omogenea e non ruotante, si determinerebbe lungo i meridiani una circolazione come quella indicata nella figura 2.



L'aria presenterebbe moti ascendenti all'equatore e discendenti ai poli; si determinerebbero correnti dirette verso i poli in quota e verso l'equatore nei bassi strati. Dato che la terra ruota, è necessario tener conto di due leggi della dinamica, che spiegano la circolazione dell'atmosfera a livello globale, così come si osserva in natura: la legge di Coriolis e quella della conservazione del momento assoluto della quantità di moto. In base alla prima legge una particella d'aria che viaggia dall'equatore verso il polo subisce una deviazione verso destra nell'emisfero settentrionale e verso sinistra in quello meridionale, deviazione che va crescendo con la latitudine. Ovvero in entrambi gli emisferi le correnti che si dirigono verso i poli tendono a divenire occidentali. In base alla seconda legge il momento assoluto della quantità di moto occidentale di una particella di massa unitaria, avente componente della velocità lungo i paralleli u e distanza dall'asse di rotazione terrestre r_p è:

$$M = r_p (u + W r_p) = \text{costante}$$

ove $W = \text{cost}$ è la velocità di rotazione della terra.

Il flusso dell'aria che negli strati superiori dall'equatore si dirige verso i poli subisce dunque per la prima legge una deviazione verso oriente, in

entrambi gli emisferi, che diventa pressochè totale intorno alla latitudine di 30 gradi; per la seconda legge, poichè, all' aumentare della latitudine r_p diminuisce e M è costante, u deve aumentare; quindi al crescere della latitudine aumenterà l'intensità del vento occidentale. In questo modo si determinano negli alti strati, nei pressi del trentesimo parallelo nord e del trentesimo parallelo sud, massimi del vento da ovest, ovvero quei poderosi flussi d'aria che vengono chiamati correnti a getto subtropicali.

Al semplice modello ad una cellula di figura 2, per il quale si era supposta la terra omogenea e non ruotante, si deve sostituire un modello più complesso che tuttavia è sicuramente ancora ben lontano dal rappresentare soddisfacentemente quello che avviene in realtà (figura 3).




Fig. 3 Circolazione generale dell'atmosfera a tre celle: di Hadley (H), di Ferrel (F) e Polare (P). Sono segnalate le posizioni del getto subtropicale (GST) e di quello polare (GP), della tropopausa tropicale (TT), intermedia (TI) e polare (TP), degli anticiclони subtropicali (A_s) e di quelli termici polari (A_t), delle alte e basse mobili delle medie latitudini (A_m e B_m), degli alisei (AL) e della zona di convergenza intertropicale (ZCIT)

La cellula più vicina all'equatore, detta di Hadley, rappresenta schematicamente la circolazione a grande scala alle basse latitudini. La persistenza dei getti subtropicali nei due emisferi costituisce una sorta di ostacolo all'estensione dei flussi d'aria in quota provenienti dall'equatore, detti contralisei, verso le zone temperate; quindi, intorno a 30 gradi di latitudine nord e sud si generano correnti discendenti. La persistenza di tali correnti determina subsidenza che favorisce la formazione di anticiclони detti, per la zona in cui si generano, subtropicali. In questi l'aria diverge e la parte che si dirige verso l'equatore, per la legge di Coriolis, devia verso occidente, dando luogo agli alisei. L'aliseo dell'emisfero nord, proveniente da nord-est e quello dell'emisfero sud, proveniente da sud-est, si incontrano lungo la "linea di convergenza intertropicale" ZCIT.

Da quanto sopra esposto risulta che le celle di Hadley rappresentano la schematizzazione dell'aria a grande scala nelle zone intertropicali e permettono il trasporto di calore dalle regioni equatoriali verso le latitudini subtropicali. L'esistenza di correnti occidentali alle medie latitudini comporta che ci siano meccanismi atti a propagare ulteriormente momento della quantità di moto occidentale dai tropici verso le zone temperate. Ciò avviene mediante due processi, uno legato alla circolazione media, l'altro a quella istantanea. Nel primo caso è la velocissima corrente a getto subtropicale che, funzionando come una specie di volano, trasmette quantità di moto occidentale all'aria delle medie latitudini. Nel secondo caso sono le configurazioni ad onda in quota proprie delle medie latitudini che, in una determinata fase del loro ciclo vitale assumono, con riferimento all'emisfero settentrionale, un orientamento da nord-est verso sud-ovest, facendo sì che l'aria proveniente dalle regioni settentrionali abbia solo una piccola componente da ovest, mentre quella proveniente dalle regioni meridionali una grande componente da ovest. Si determina quindi un trasporto verso sud di una piccola quantità di moto occidentale e un trasporto verso nord di una grande quantità di moto occidentale, tanto che quest'ultima, risultando prevalente, fa sì che, alla fine del ciclo ondulatorio, si ricostituiscano alle latitudini superiori delle zone temperate i preesistenti forti flussi occidentali che costituiscono la corrente a getto polare (figura 4). Nelle configurazioni di flusso, infatti, si alternano stadi di indice alto, in cui le correnti a getto sono zonali, ovvero seguono quasi i paralleli (figura 5a) e stadi di indice basso, in cui le correnti diventano meridiane e prevalgono saccature e promontori di grande estensione, che permettono il trasporto verso nord di momento occidentale (figura 5 b c).




Fig. 4 Le onde in quota alle medie latitudini, in una certa fase del loro ciclo vitale, determinano un grande trasporto di quantità di moto occidentale verso nord. La figura si riferisce all'emisfero settentrionale




Fig. 5 Fasi del ciclo ondulatorio delle configurazioni di flusso in quota alle medie latitudini.

Alla fine si determinano configurazioni chiuse di bassa e alta pressione alle latitudini inferiori e si ricostituisce la corrente a getto zonale a quelle superiori (figura 5 d).

Le saccature e i promontori in quota, associati rispettivamente ai cicloni e agli anticicloni mobili al suolo, costituiscono una sorta di macroturbolenza, che opera il trasporto meridiano del momento della quantità di moto. Il trasporto di energia attraverso le medie latitudini, attuato dalle saccature e dai promontori in quota, dalle correnti a getto polari, dai cicloni e dagli anticicloni al suolo, dai fronti, tutti sistemi tra loro intimamente connessi, è assai complesso. Infatti sono coinvolte molte forme di energia, che possono anche trasformarsi l'una nell'altra: energia cinetica, energia potenziale di gravità, energia interna, calore latente, il tutto complicato dagli scambi con la superficie degli oceani, delle terre emerse, delle distese di ghiaccio ecc..

Per completare la descrizione delle cellule di circolazione evidenziate nella figura 3, si ponga l'attenzione su quella a nord del 60° parallelo. L'esistenza di cellule di questo genere non è sicura. Tuttavia l'osservazione mostra che sulle calotte polari in media prevalgono anticicloni termici. L'aria fredda che diverge da tali anticicloni, dirigendosi verso le latitudini inferiori, devia verso ovest per Coriolis e va a convergere con quella calda delle medie latitudini, che mediamente è trasportata da correnti occidentali. Si determinano in questo modo condizioni di forte gradiente termico e di intensa baroclinicità, caratteristici dei sistemi frontali, sui quali si sviluppano i cicloni extratropicali. Gli scambi d'aria lungo i meridiani alle medie latitudini possono schematizzarsi con le cellule di Ferrel solamente dal punto di vista delle medie. Le cellule di Ferrel vengono dette a circolazione indiretta perchè nella parte meridionale, dove l'aria è più calda, darebbero luogo a moti subsidenti e in quella settentrionale, ove l'aria è più fredda, a moti ascendenti. Palmen ideò un modello che sembra descrivere in modo migliore ciò che accade in realtà, in particolare per quel che riguarda la circolazione di masse d'aria di diversa origine (figura 6).




Fig.6 Modello di circolazione a tre celle dovuto a Palmen (1951)

In tale modello la parte discendente della cellula di Hadley si divide in due rami: uno torna verso l'equatore a chiudere la circolazione della cellula stessa, l'altro volge verso il polo, salendo in quota lungo la superficie del fronte polare. Durante questa ascesa l'aria tropicale si inserisce nelle correnti occidentali, proprie delle medie latitudini, e, mescolandosi con esse, perde le sue caratteristiche originali. Il flusso, poi, superato in quota il fronte polare, ridiscende, dividendosi in due rami: uno, diretto verso il polo, subisce un rimescolamento orizzontale con l'aria polare, l'altro, diretto verso l'equatore, va a ricollegarsi alla cellula di Hadley intorno al 30° parallelo, nella zona in cui, prevalendo la divergenza, non ci si attende una zona limite ben marcata fra diverse masse d'aria. Il modello di circolazione a tre celle della figura 3 può dunque essere sostituito da quello della figura 7, nel quale risulta evidente come alle medie latitudini predomini la circolazione legata ai sistemi frontali, mentre alle basse latitudini quella associata alla cellula di Hadley. L'aria polare si dirige verso le latitudini inferiori a ovest dei sistemi frontali, mescolandosi con l'aria discendente dagli strati superiori dietro la superficie frontale. Confluisce quindi, ormai trasformata, nella parte inferiore della cella di Hadley, ovvero negli alisei. Aria tropicale, proveniente dalla cellula di Hadley viene invece verso nord, salendo in quota nei grandi




Fig. 7 Modello schematico di circolazione generale dell'atmosfera dovuto a A. e F. Defant (1958)

BIBLIOGRAFIA

BRUNETTI-CACCIOLA Riv. Meteorologia Aeronautica A.54 N3-4

F. AFFRONTI - Atmosfera e Meteorologia – Sommario storico scientifico. Dai miti del passato alle prospettive del futuro - S.T.E.M. Mucchi Modena.

M. CONTE, C. TODARO - Nota sulla Circolazione Generale dell'Atmosfera.

G ARNIER - Compendium of lecture notes in climatology for class III and class IV personnel - WMO N°726 (1992).

A. HUFTY - La climatologia - Newton Compton Editori - 1979

E. P ALMEN, C.W. NEWTON - Atmospheric Circulation Systems - Their Structure and Physical Interpretation, International Geophysics Series (1969).

E.R. REITER - Le correnti a getto - Zanichelli Bologna(1969) .

O.D. SUTTON- La nuova meteorologia - Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori (1963).

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it



La scienza del tempo

Corso di Meteorologia Multimediale (3° Livello)

Struttura caratteristica dell'atmosfera e principali masse d'aria

1. Aria polare, delle medie latitudini, tropicale: caratteristiche e proprietà


Le proprietà di una massa d'aria dipendono in gran parte dalla radiazione solare e dallo scambio di calore ed umidità con la sottostante superficie terrestre. In base a ciò, si possono distinguere masse d'aria con proprietà tipiche, connesse alla regione geografica di origine, "regione sorgente" a condizione che esse abbiano sostato sufficientemente a lungo su tale area, tanto da averne assunto le proprietà caratteristiche.

Tali classificazioni, che in genere riguardano l'emisfero settentrionale, sono state dedotte principalmente dalle analisi sinottiche in superficie e quindi risentono sensibilmente della distribuzione di pressione in superficie e dei modelli di flusso degli strati più bassi dell'atmosfera. Le più recenti conoscenze della struttura verticale dell'atmosfera, con i forti "windshear" verticali, le notevoli variazioni di direzione del vento con la quota etc., suggeriscono che in una determinata colonna atmosferica, ai diversi livelli, l'aria possa provenire da regioni geografiche con caratteristiche molto diverse.

Per quanto sopra, ed in considerazione del fatto che l'influenza della superficie terrestre si può manifestare a varie quote, risulta difficoltoso dedurre classificazioni delle masse d'aria semplicemente in base alle "regioni sorgenti" ed ai successivi percorsi. Allo scopo di delineare un quadro molto sintetico delle configurazioni essenziali che caratterizzano l'atmosfera a livello emisferico, sembra conveniente suddividere le masse d'aria in tre classi principali: aria tropicale (AT), aria delle medie latitudini (AML) e l'aria polare (AP).

Le regioni sorgenti dell' AT sono le zone degli alisei di entrambi gli emisferi, limitate verso il polo dalla fascia delle alte subtropicali. Le regioni sorgenti dell' AP sono le regioni artiche e subartiche dell'emisfero nord e quelle antartiche e sub-antartiche dell'emisfero sud. L'estensione verso l'equatore di queste regioni sorgenti di masse d'aria non è ben delineata e subisce delle variazioni stagionali. Di conseguenza, non risultano ben definite le regioni sorgenti di AML, in quanto sottoposte a forti variazioni meridiane nel soleggiamento e nelle influenze termiche da parte della superficie della terra e da grandi variazioni longitudinali per i contrasti termici tra i continenti e gli oceani. Il fronte polare, nella teoria originale, veniva considerato il confine tra l'AP e l'AT (o la subtropicale), per cui la sua posizione sulle carte sinottiche indicava l'estensione di quest'ultima verso il polo. Solo la scoperta di una circolazione tropicale relativamente chiusa del tipo di Hadley e di una circolazione contraria extratropicale del tipo di Ferrel e dell'esistenza di due correnti a getto principali in entrambi gli emisferi e delle corrispondenti

La distinzione tra AT e AML non è sempre evidente negli strati più bassi dell'atmosfera ove, a causa della divergenza, non esiste un limite ben distinto tra la cellula di Hadley e quella di Ferrel, ma appare naturale nella media ed alta troposfera, ove esiste tra le due cellule una zona di convergenza meridionale. Contrasto tra AML ed AP dovrebbe invece essere distinguibile negli strati medio bassi della troposfera, nella zona di convergenza meridionale esistente tra la cellula di Ferrel e quella Polare. (fig.1).






Fig. 1 Le zone di convergenza meridionale, dove si contrastano masse d'aria con proprietà termiche differenti. Esse sono

riscontrabili al confine tra la cellula di Hadley e quella di Ferrel nell'alta troposfera e tra la cellula di Ferrel e quella polare negli strati prossimi al suolo

Dunque l'AML è più facilmente individuabile negli strati medio-alti della troposfera, dove "serpeggiano" le caratteristiche correnti occidentali. Queste ultime non risentono dell'influenza delle condizioni tropicali, se non in parte, e dunque non possono essere considerate composte di aria tropicale. Tuttavia, regolari inserimenti di AT si manifestano nella parte occidentale delle alte pressioni subtropicali, dove l'AT dei bassi livelli si muove verso il polo come una corrente ascendente, finché non raggiunge l'equilibrio termico con le correnti occidentali della media e alta troposfera, caratteristiche della zona temperata. Viceversa, l' AML ridiscende sul bordo sud-orientale degli anticicloni subtropicali, portandosi verso i livelli più bassi (figura 2).




Fig.2 Schema raffigurante le linee di corrente "serpeggianti" da ovest nei livelli più alti (a tratto continuo), e gli anticicloni al livello del mare (linee tratteggiate). La linea più spessa indica la traiettoria discendente dell'aria delle medie latitudini, mentre la doppia linea indica il percorso ascendente dell'aria tropicale.

Questo meccanismo rappresenta una regolare trasformazione di AT in AML. Per questo motivo si ritiene più corretto considerare la massa d'aria più meridionale del fronte polare, come una massa

Alle medie latitudini gli strati più bassi dell'atmosfera sono soggetti a frequenti incursioni di AT verso il polo e di AP verso l'equatore. Malgrado le modificazioni dovute agli scambi di energia con la superficie sottostante ed ai moti verticali, tali masse d'aria mantengono in gran parte le proprietà caratteristiche della loro regione d'origine. Tuttavia, a causa dell'influenza del gradiente meridiano di temperatura sulla variazione del vento con la quota, le traiettorie che, nei bassi livelli sono direttamente collegate alle regioni sorgenti tropicali e polari, alle quote più alte confluiscono in seno alle correnti occidentali. In tal modo, un sondaggio effettuato alle medie latitudini, può rilevare AT o AP nella bassa troposfera e AML, rimasta più a lungo sulla zona, nella troposfera superiore. Per quanto visto, ogni classificazione delle masse d'aria contiene necessariamente una certa indeterminazione; d'altra parte, dall'esperienza

In pieno accordo con i principi fin qui delineati risulta la classificazione delle principali masse d'aria elaborata da Defant e Taba negli anni cinquanta. Questi studiosi, in base ai sondaggi effettuati a tempi sinottici scelti opportunamente in relazione ad analisi ricche di fronti, correnti a getto e tropopause, costruirono lo schema di fig. 3.




Fig. 3 Sezione meridiana dell'atmosfera sull'emisfero nord. Le linee intere sono isoterme in gradi centigradi; G_p e G_s denotano la posizione del Getto Polare e di quello Subtropicale.

In esso, il fronte polare è associato ad un getto nell'alta troposfera e ad una interruzione nella tropopausa. Il getto associato al fronte polare e la struttura della tropopausa nelle sue vicinanze caratterizzano il confine delle masse d'aria (AP e AML) in questi alti livelli. Nella media troposfera il confine tra masse d'aria è individuato dalla pronunciata baroclinicità propria del fronte polare, mentre in superficie è solitamente ben individuato da tutti gli elementi che caratterizzano il fronte polare a tale livello: variazione brusca nella direzione del vento, variazioni dell'andamento della pressione nel tempo, fenomeni ecc.. Negli strati più bassi della troposfera, tuttavia, l'influenza termica della superficie terrestre modifica spesso le condizioni dell'aria polare, in modo che la temperatura di quest'ultima non può più essere considerata caratteristica delle regioni sorgenti.

La frattura della tropopausa subtropicale ed il getto subtropicale individuano invece il confine tra AML ed AT. Mentre la baroclinicità del fronte polare nella media troposfera, che definisce il confine tra masse d'aria a questi livelli, risulta meno evidente se si media il campo della temperatura rispetto allo spazio e al tempo, la frattura della tropopausa subtropicale, apparendo a latitudini relativamente costanti, è distinguibile anche in sezioni mediate (fig. 4).




Fig. 4 Temperature in °C mediate lungo cerchi di latitudine per gennaio e luglio. Le linee più scure mostrano la posizione media delle tropopause.

Al di sotto del livello del getto subtropicale, il confine di massa d'aria è rappresentato dalla zona baroclina del fronte subtropicale. Tale fronte è individuabile solamente in quota e quindi nella troposfera medio-bassa non risulta determinato alcun chiaro confine di massa d'aria, in accordo al fatto che a queste latitudini prevale, nei bassi livelli, l'azione frontolitica della divergenza.

2. Caratteristiche dell'aria artica

La classificazione delle principali masse d'aria delineate nel paragrafo precedente costituisce uno schema efficace ma molto semplificato, che volutamente non include distinzioni più particolareggiate che pure possono essere considerate. Ad esempio, su molte zone della terra possono essere distinte masse d'aria continentali da quelle marittime. Tra queste possono essere individuati, nella bassa troposfera, veri e propri fronti che tendono a svanire nei livelli medi e alti.

Particolare attenzione merita la massa d'aria artica, separata dall'aria polare dal cosiddetto fronte artico. La sottoclassificazione dell' AP in aria artica e aria polare vera e propria fu originariamente proposta da Bergeron (1928). Con riferimento all'emisfero nord, il fronte artico è spesso ben distinguibile su certe regioni delle alte latitudini, specie durante la stagione più fredda, apparendo tuttavia come confine di massa d'aria solamente alle quote più basse ove è fortemente influenzato dalla distribuzione della copertura delle neve sui continenti e dalla estensione della copertura dei ghiacci sull'oceano artico. Per tale motivo risulta di frequente difficile distinguere l'aria di vera origine artica dalla spesso ugualmente fredda, se non più fredda, aria "continentale polare" che si origina a latitudini più basse (ad esempio sul continente euroasiatico durante la stagione invernale). Nelle parti più alte della troposfera è poi pressochè impossibile mantenere la distinzione tra aria artica e polare, in quanto a tali livelli normalmente l'aria polare è proprio fredda quanto l'aria artica.

3. Struttura dell'atmosfera

Con riferimento alla classificazione delle principali masse d'aria delineata nei paragrafi precedenti, nonché ai sistemi caratteristici dell'atmosfera cui si è fatto cenno, è possibile costruire uno schema della struttura dell'atmosfera nei suoi primi 20.000 metri di spessore (fig. 5).




Fig. 5 Principali masse d'aria, tropopausa, fronti e correnti a getto, in relazione ai sistemi di vento nei bassi strati. I fronti possono essere ben sviluppati o relativamente deboli, in relazione ai diversi periodi dell'anno e alle regioni geografiche.

Tale schema, molto semplificato, si riferisce all'emisfero settentrionale, dal polo nord all'equatore, ed è applicabile alla struttura atmosferica nella stagione fredda, quando tutte le configurazioni sono ben pronunciate. In accordo con quanto sopra esposto, la troposfera risulta divisa in tre differenti masse d'aria: AT, AML, AP. Viene posta in risalto anche la possibile suddivisione dell' AP in aria artica e polare vera e propria, con il fronte artico come elemento di separazione. Tale fronte, individuabile solamente nei bassi strati, è disegnato con linee tratteggiate, per indicare che è un sistema non sempre presente nella troposfera.

L'AP risulta limitata verso sud dal fronte polare e dal getto polare, posizionato nella frattura tra la tropopausa polare e quella delle medie latitudini. Il fronte polare negli strati più bassi e in quelli più alti è disegnato con linea tratteggiata per indicare che in questi livelli sono possibili scambi di massa d'aria fra differenti regioni sorgenti, dovuti ai cicloni a scala sinottica che contribuiscono in modo sostanziale al trasferimento meridiano di energia. Il fronte subtropicale, con il getto subtropicale nella frattura tra tropopausa delle medie latitudini e la tropopausa tropicale, divide negli strati medio-alti l'AML dall'AT. Tale fronte è disegnato con linea tratteggiata, in quanto appare solo in certe regioni, mentre in altre risulta mal definito o del tutto assente. Al fronte subtropicale che giace su una regione in cui prevale divergenza nei bassi strati, non corrispondono, il più delle volte, caratteristiche di tempo quali quelle associate al fronte polare, del quale peraltro è geograficamente più permanente, in quanto legato ad un getto molto stabile in latitudine. Nella regione tropicale, oltre alla tropopausa principale è messa in evidenza, ad una quota più bassa, una tropopausa secondaria; quest'ultima corrisponde al livello nel quale si può trovare generalmente un pronunciato aumento della stabilità verticale ed il massimo della velocità meridiana nella cellula di Hadley.

Nello schema di fig. 5 le posizioni dei fronti e delle correnti a getto rappresentano la latitudine media di questi sistemi nella stagione più fredda. In particolare la latitudine del fronte polare varia notevolmente con la longitudine e nel tempo; per questo motivo tale sistema non può essere riconosciuto in sezioni meridiane, costruite facendo le medie lungo interi cerchi di latitudine. Lo schema è valido in situazioni sinottiche nelle quali i moti dell'aria sono prevalentemente zonali. Nei casi di interruzione del moto zonale con formazione di profondi cicloni freddi alle basse latitudini e anticicloni caldi alle alte latitudini, il modello termico e di flusso si discosta notevolmente dallo schema. Nei casi estremi di circolazione a basso indice, infatti, una sezione meridiana può mostrare l'esistenza di due getti polari occidentali, a ben distinte latitudini, ed un getto orientale tra essi.

BIBLIOGRAFIA

BRUNETTI-CACCIOLA Riv. Meteorologia Aeronautica A.56 N1-2

[1] - F. AFFRONTI Atmosfera e Meteorologia Sommario storico scientifico. Dai miti del passato alle prospettive del futuro - S.T.E.M., Mucchi, Modena.

[2] - B'J'GARNIER - Compendium of lecture notes in climatology for class III and class IV personnel - WMO No 726 (1992).

[3] - E. PALMEN, C.W. NEWTON - Atmospheric Circulation Systems - Their Structure and Physical Interpretation, International Geophysics

Series (1969)

[4] - E.R. REITER - Le correnti a getto) - Zanichelli, Bologna, (1969)

(1) T. Bergeron, studioso tedesco, nel 1928 elaborò una "classificazione geografica" delle masse d'aria, distinguendole in quattro tipi fondamentali (artica, temperata, tropicale, equatoriale) ed in sottotipi, in base alle regioni di origine (mari, continenti).

(2) G. Schinze, studioso tedesco, condusse interessanti ricerche, sostenute da ampie indagini statistiche nel periodo dal 1932 all'inizio della seconda guerra mondiale, determinando le caratteristiche medie delle principali masse d'aria nei vari mesi dell'anno sull'Europa centrale.

(3) S. Petterssen era nato a Hadsel nel 1898; dopo la laurea intraprese la carriera di meteorologo, lavorando prima a Bergen, poi a Tromsø e, nel 1931, di nuovo a Bergen, dove diresse il Centro di previsioni meteorologiche. Nel 1939 assunse la presidenza della Commissione di meteorologia marittima in seno all'OMI. Durante il secondo conflitto mondiale, assunse il grado di Ten. Colonnello delle forze aeree norvegesi, svolse una parte di primo piano in occasione dello sbarco alleato in Normandia. Morì il 31 dicembre del 1974.

[home](#) [didattica](#) [chi siamo](#) [f.a.q.](#) [satellite](#) [software](#) [antartide](#) [atlante delle nubi](#)

e-mail: info@meteorologia.it